



La Chouette de Tengmalm est un petit rapace (25 cm) nocturne et sédentaire. Le dessus du plumage est de couleur brun-gris foncé et le dessous, de couleur blanche tachetée de gris. Elle est surtout active au crépuscule et à l'aube.

Le chant du mâle est souvent le meilleur moyen de repérer la Chouette en forêt. Ce chant est surtout audible à la fin de l'hiver.

Cycle biologique

La Chouette de Tengmalm niche dans des cavités d'arbres généralement creusées par les pics. La femelle pond habituellement 4 à 5 œufs en mars-avril et les couve pendant un mois. Les jeunes sont ensuite élevés jusqu'en juillet.

Habitats privilégiés

On la rencontre surtout dans les forêts de type boréales ou montagneuses, et affectionne particulièrement les vieux peuplements possédant des cavités favorables à sa nidification.

Répartition géographique

Son aire de distribution va de la péninsule scandinave jusqu'aux Pyrénées en passant par une grande partie de l'Europe centrale et les Alpes. En France, elle se cantonne principalement aux secteurs montagneux. Sur le site de la ZPS, quelques individus ont été observés dans le Nord du secteur et une seule nidification est avérée.

Menaces

- Urbanisation et aménagements lourds
- Milieu forestier inadapté (futaies trop régulières, rajeunissement des peuplements)

Préconisations de gestion

La principale mesure de gestion à prendre est de maintenir une forêt riche et diversifiée avec des arbres à cavités et des vieux bois qui permettent la nidification de la Chouette.