



Le Martin-pêcheur peut mesurer jusqu'à 17 cm. C'est un oiseau territorial de couleurs vives : bleu-vert sur le dessus et roux orangé sur le dessous. Le dessus du bec est entièrement noir alors que le dessous présente une partie rougeâtre plus développée chez la femelle. Les pattes du Martin-pêcheur sont rouges.



Cycle biologique

La période de reproduction s'étend d'avril à juillet. La femelle pond ses œufs (5 à 8) dans un terrier au niveau de la berge d'un cours d'eau. Les adultes les couvent pendant environ 4 semaines. Un couple peut élever 2-3 couvées par an. La nuit, il dort seul dans la végétation riveraine, les roseaux ou arbres creux.



Habitats privilégiés

On observe le Martin-pêcheur en plaine, au bord des eaux calmes, propres et peu profondes. De par son régime alimentaire, l'eau doit être pure et poissonneuse. Il apprécie les rives pourvues d'arbres qu'il utilise comme perchoirs.



Répartition géographique

Le Martin-pêcheur est largement présent en Europe et en Asie. On le trouve également en Afrique du Nord où il peut migrer en hiver. Sur le site de la ZPS, il est présent au niveau de tous les cours d'eau où les populations sont bien établies.



Menaces

Les principales menaces pour l'espèce sont les dérangements humains, les modifications apportées aux cours d'eau ainsi que la dégradation de la qualité de l'eau.

Préconisations de gestion

- Améliorer la qualité des cours d'eau (tant physique que chimique) et des berges
- Limiter les dérangements en période de reproduction