



Le Pic noir est le plus grand des pics, il mesure jusqu'à 46 cm. Il est facilement reconnaissable à sa calotte rouge vif s'étendant du front jusqu'à l'arrière de la nuque, le reste du corps étant entièrement noir.



Cycle biologique

Le mâle creuse une cavité dans un arbre ou il attire la femelle pour se reproduire. La parade débute dès le mois de mars et peut durer deux mois. Après l'accouplement (avril-mai), la femelle pond 4 œufs qu'elle couve 12 jours. Les jeunes quittent le nid au bout de 27 jours.



Habitats privilégiés

Le Pic noir est un oiseau sédentaire que l'on retrouve dans les vieux peuplements feuillus (principalement de hêtre). Il creuse sa cavité exclusivement au niveau des troncs de hêtre.



Répartition géographique

Le Pic noir est présent partout en Europe à l'exception des îles britanniques, du Portugal et d'une majorité des territoires espagnol et italien. En France, il est présent sur l'ensemble du territoire à l'exception du Sud-ouest et du littoral méditerranéen. Sur le site de la ZPS, il est observé dans tous les vieux peuplements feuillus.



Menaces

Les rajeunissements des peuplements (coupes des vieux arbres) et l'élimination des arbres morts lui sont particulièrement préjudiciables.

Préconisations de gestion

- Mettre en place des îlots de vieillissement au sein des peuplements de hêtres
- Maintien de bois mort sur pied et d'arbres à cavités
- Limiter les coupes pendant la période de nidification (respect de la quiétude)